LITHIASE URINAIRE

F. PECOUX

Généralités

- Augmentation constante depuis 30 ans de la maladie lithiasique oxalo-calcique dans les pays industrialisés.
- Prévalence en France 10 à 15%
- Calcul radio opaque chez 1,6 à 3,8% des hommes et 0,7% des femmes
- Sexe ratio = 2 hommes pour 1 femme
- Pic de fréquence:
 - Hommes = 40 - 49 ans
 - Femmes = 30 – 39 ans
- Récidive > 50%
- Moins de 20% des crises de coliques néphrétiques sont hospitalisées
- Risque d'insuffisance rénale

LITHOGENESE

- Calculs: concrétion constituée de composés cristallins associés à une matrice protéique sur laquelle les cristaux s'organisent
- 4 étapes:
 - Nucléation
 - Croissance
 - Agrégation
 - Fixation des cristaux sur l'épithélium
- Les cristaux se forment lorsque la sursaturation des urines est excessive à cause d'anomalies métaboliques, et/ou d'une diurèse insuffisante
- Importance du PH pour la solubilité des composés lithogènes

Facteurs de risque

■ Alimentation:

Augmentation de la consommation:

- de produits laitiers
- de protéines animales
- de sel
- d'aliments riches en oxalates (chocolat)
- de sucres rapides (soda...)

Diminution de la consommation de fibres alimentaires

Diurèse insuffisante

■ Familiaux:

ATCD familiaux dans 40% des cas (+ des habitudes alimentaires)

NB = cystinurie représente la principale maladie génétique

Facteurs de risque

■ Constituants des calculs:

- Oxalate de calcium = constituant principal pour 75 à 80% des calculs
- Lithiase d'infection = 5% des calculs
- Calculs de phosphate de calcium = 24%
- Lithiase urique augmente chez le sujet âgé >60 ans

■ Anomalies anatomiques:

- Favorise la stase des urines
- Sera à traiter avec la maladie lithiasique (ex = polykystose rénale, sd de jonction pyélo urétérale, rein en fer à cheval...)

■ Calculs médicamenteux (<1% des calculs)

Clinique

- Absence de corrélation entre la taille d'un calcul et son retentissement
- Responsable de 80% des coliques néphrétiques de l'adulte
- La colique néphrétique est un symptôme
- Colique néphrétique = mise en tension brutale de la voie excrétrice et de la capsule rénale au dessus d'un obstacle (calcul, tumeur, caillot, compression extrinsèque...).
- Interrogatoire spécifique de la maladie lithiasique:
 - Recherche existence de facteurs environnementaux favorisant la migration calculeuse (voyage prolongé, séjour en pays chaud...)
 - Recherche d'ATCD personnels familiaux (histoire lithiasique, hypercalcémie...)
- Examen clinique (cf. urgences)

Evolution de la crise

- Favorable le plus souvent
- Spontanément résolue avec émission du calcul dans 80% des cas des calculs <6mm
- CNA à répétition
- Rare = rupture voie excrétrice (rupture fornix)
- Diagnostic différentiel: cf. urgences

Examens complémentaires

■ Radiologiques = ASP + écho réno-vésicale

□ ASP:

- Recherche opacité calcique sur les voies excrétrices (n'élimine pas le diagnostic)
- Recherche diagnostic différentiel (calculs biliaires, calcifications pancréatiques, anévrisme aortique...)

□ Echo:

- Recherche dilatation des cavités pyélocaliciennes
- Recherche calcul (taille, localisation...)

□ +/- TDM (avec ou sans injection): visualise tous les types de calculs

Examens complémentaires

■ Biologiques:

□ BU:

- Recherche hématurie microscopique
- Élimine infection urinaire
- Évalue le pH urinaire (acide = acide urique, oxalo-calcique, cystine / basique = infectieux, phosphocalcique)

□ Bilan métabolique:

- Calcémie + calciurie des 24 heures
- Phosphorémie + phosphaturie des 24 heures
- Créatininémie
- Uraturie des 24 heures
- Oxalates urinaires
- +/- parathormonémie

Traitement médical

- Colique néphrétique simple ou compliquée => cf. urgences
- Traitement médical de fond (dépend de la nature du calcul), afin de limiter les récurrences:
 - Cure de diurèse:
 - 2L / 24 heures
 - Éviter les boissons sucrées, bière
 - En fonction du pH urinaire => alcaliniser les urines (Vichy célestin pour les lithiases uriques ou cystiniques)
 - Diminuer les apports calciques, oxalates, acide urique
 - Traitement médicamenteux:
 - Allopurinol en cas d'hyperuricémie
 - Citrate de potassium en cas de lithiase oxalo-calcique avec hypercalciurie
 - Diurétiques thiazidiques en cas d'hypercalciurie

Traitement chirurgical

- Drainage de la voie urinaire en urgence:
 - Sonde urétérale ou double J
 - Néphrostomie percutanée

Traitement (2)

- Lithotritie extra corporelle:
 - Principe = onde de choc, moyen le + simple, le + accessible et le moins invasif
 - Risque: hématurie, colique néphrétique post LEC
 - Indication: calcul rénal <20mm, calcul urétéral <10mm

Lithotritie extra corporelle

Traitement chirurgicale (3)

■ Néphrolithotomie per cutanée:

- Principe: ponction percutanée du rein (introduction d'un endoscope, visualise, fragmente puis retire les fragments)
- Avantages: traitement des calculs volumineux, utilisation de la LEC pour les petits fragments
- Inconvénients: risque hémorragique, risque de lésions d'organes (côlon), risque infectieux
- Indications: calculs volumineux >20mm complexes ou coralliformes, calculs associés à une anomalie anatomique, échec de la LEC

Néphrolithotomie per-cutanée

Traitement chirurgical

■ Urétéroscopie:

- Principe: introduction rétrograde, par les voies naturelles, d'un endoscope qui permet la visualisation du calcul, fragmentation par onde de choc, et retrait des fragments à la pince
- Avantages: extraction des calculs urétéraux, morbidité minimum
- Inconvénients: lésions urétérales (perforation, avulsion ou désinsertion urétérale)
- Indication: calcul de l'uretère pelvien >6mm, calcul de l'uretère lombo-iliaque enclavé

■ Chirurgie à ciel ouvert:

- Diminue depuis 20ans
- Indication: calculs coralliformes, obstruction du parenchyme rénale par calculs, anomalie anatomique associée

Calcul de vessie

- Rares
- Concerne le sujet âgé avec obstacle sous vésical gênant la vidange
- Fragmentation par voie endoscopique
- + RTUP associé